


Guatemala, 5 de agosto de 2026 13:00 horas (hora local)

FINALIZA LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO

En seguimiento al boletín especial BEFGO-065, INSIVUMEH mantiene un monitoreo multiparamétrico continuo de la actividad eruptiva, lo cual ha permitido evaluar e identificar variaciones importantes de la actividad volcánica en las últimas horas. Tras este análisis, se confirma que: **tras acumular 50 horas desde su inicio, el 3 de agosto a las 08:30 horas, LA ERUPCIÓN HA FINALIZADO.**



Estas 50 horas de actividad produjeron un amplio conjunto de productos volcánicos, entre estos los que mayor impacto han generado son las corrientes de densidad piroclástica, la dispersión y caída de ceniza. Las barrancas más afectadas y con mayor cantidad de material eruptivo acumulado son:

barranca Seca (flanco oeste) y barranca Ceniza (flanco suroeste). El cráter del volcán, también ha sido sometido a procesos de erosión drásticos durante toda la erupción, lo cual ha cambiado su morfología. Las zonas y comunidades con mayor afectación por caída de ceniza se ubican en el flanco oeste y suroeste, ubicadas en la región municipal de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.

AMENAZAS ACTIVAS

La actividad en niveles normales para el volcán de Fuego, se caracteriza por: explosiones débiles y moderadas en un rango de 4 a 6 por hora, pulsos incandescentes entre 100 y 200 metros de altura sobre el cráter, valores sísmicos de RSAM entre 200 y 600, y columnas de gas y ceniza que alcanzan los 4800 msnm. Se espera que esta actividad continúe por los siguientes días o semanas.

Es importante resaltar que en consecuencia a los productos volcánicos generados durante la erupción, persisten las siguientes amenazas de forma activa, las cuales deben ser consideradas en las actividades de respuesta local y municipal: lahares, removilización de ceniza y dispersión de ceniza.

- **Lahares:** el material volcánico se mezcla con agua de lluvia y desciende en forma de flujos por las diferentes barrancas del volcán. Considerando el material recientemente depositado en las barrancas Ceniza y Seca, los flujos en estas podrían ser de características fuertes, afectando pasos vehiculares y peatonales de las comunidades aledañas a dichas barrancas. Para esto, INSIVUMEH elabora el Pronóstico Basado en Impactos (PBI) que lista e identifica las barrancas y comunidades que pueden ser afectadas directa o indirectamente por esta amenaza, sobre todo ante eventos meteorológicos que incrementan las lluvias, como ondas del este.
- **Removilización de ceniza:** la ceniza fina depositada en las superficies de techos de viviendas, patios, zonas agrícolas y áreas sociales abiertas, puede ser removilizada nuevamente por el viento y provocar que esta se disperse y mantenga suspendida en niveles bajos por varias horas o días.
- **Dispersión de ceniza:** la actividad explosiva del volcán de Fuego, en sus niveles normales, mantendrá la emisión de ceniza en alturas inferiores a los 5000 msnm y será dispersada a favor del viento varias decenas de kilómetros.

INSIVUMEH mantiene la vigilancia visual e instrumental de la actividad volcánica a través de sus observadores en campo, sensores sísmicos y de infrasonido, cámaras web y productos de imágenes satelitales. Ante un cambio en cualquiera de las condiciones de incremento mencionadas anteriormente, se emitirán nuevos boletines vulcanológicos especiales.

RECOMENDACIONES ANTE ESTA ACTIVIDAD POR PARTE DE INSIVUMEH

A SE-CONRED:

Se confirma que la actividad eruptiva del volcán de Fuego ha finalizado, por lo cual se recomienda activar los protocolos de respuesta y gestión de riesgo pertinentes. Así mismo, considerar que permanecen amenazas activas, las cuales se han listado en el presente boletín. Comunicar la información de este boletín a las comunidades cercanas al volcán, especialmente aquellas en un radio de 10 km.

A DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL:

El volcán de Fuego, en su nivel de normalidad, seguirá generando ceniza por la actividad explosiva que este presenta. Se recomienda tomar precauciones con el tráfico aéreo a distancias de hasta 50 kilómetros al oeste y noroeste del volcán, en alturas inferiores a los 5000 msnm. Se recomienda estar pendientes de los mapas de dispersión de ceniza que INSIVUMEH pueda generar.

A INGUAT Y MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO:

Hacer del conocimiento de agencias de turismo, guías turísticos y turistas que la erupción ha finalizado, y trabajar en conjunto con las instituciones de gestión de riesgo para analizar reactivar las acciones turísticas en la zona volcánica, considerando las amenazas que permanecen activas y que se han descrito en este boletín especial.